

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) являются наиболее эффективными препаратами для лечения кислотозависимых заболеваний. Из гастроэнтерологической практики ИПП активно внедряются в другие специальности, в частности в кардиологию и ревматологию, где применяются с целью защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и предупреждения желудочно-кишечных кровотечений при долгосрочной антитромботической терапии и длительного применения нестероидных противовоспалительных препаратов.

Цель обзорной статьи — изложить и проанализировать данные международных и национальных исследований о наличии сердечно-сосудистого риска при длительном применении ИПП.

Материал и методы. При подготовке статьи использованы материалы из рецензируемых статей, опубликованных в PubMed, Scopus и e-library.ru с 2013 по 2025 годы с использованием ключевых слов: ингибиторы протонной помпы, сердечно-сосудистый риск, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, инсульт, нарушения ритма, рабдомиолиз.

Результаты. В текущем десятилетии опубликован ряд зарубежных обзоров, в которых рассматриваются связи между длительным применением ИПП и рядом заболеваний/состояний, в том числе описан сердечно-сосудистый риск при их приеме. Данные, представленные в обзоре, позволяют предполагать наличие возможной связи длительного приема ИПП с развитием инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, инсульта и нарушений ритма.

Заключение. Повышение осведомленности врачей и пациентов о правильном использовании ИПП и знание о побочных эффектах длительной терапии позволят оптимизировать применение данных препаратов в реальной клинической практике, особенно у коморбидных пациентов с сердечно-сосудистой патологией.